

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Бекладейм.

Международное непатентованное наименование: Беклометазон + Гентамицин + Клотримазол.

Лекарственная форма: крем для наружного применения.

Состав:

Безводный Беклометазона Дипропионат ВР	0,025% w/w;
Гентамицина сульфат ВР экв. Гентамицину	0,1% w/w;
Клотримазол USP	1,0% w/w;
В кремовой основе	q.s.

Фармакотерапевтическая группа: Препарат с антибактериальным, противогрибковым и противовоспалительным действием для наружного применения.

Код АТХ: D07CC04.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Бекладейм - противовоспалительное, противоаллергическое, антибактериальное, противогрибковое средство.

Беклометазон оказывает противовоспалительное, противоаллергическое, антиэкссудативное и противозудное действие. Тормозит накопление лейкоцитов, высвобождение лизосомальных ферментов и медиаторов воспаления, угнетает фагоцитоз, уменьшает сосудисто-тканевую проницаемость, препятствует образованию воспалительного отека.

Гентамицин антибиотик широкого спектра действия из группы аминогликозидов, оказывает бактерицидное действие в отношении *грамотрицательных* бактерий - *Pseudomonasaeruginosa*, *Enterobacteraerogenes*, *Escherichiacoli*, *Proteusvulgaris*, *Klebsiellarpneumoniae*; *грамположительных* бактерий: *Streptococcuspp.*, *Staphylococcus aureus*.

Клотримазол оказывает противогрибковое действие за счет нарушения синтеза эргостерина, являющегося составной частью клеточной мембраны грибов. Активен в отношении: *Trichophytonrubrum*, *Trichophytonmentagrophytes*, *Epidermophytonjoccosum*, *Microsporumcanis*, *Candida albicans*, *Malassezia furfur* (*Pityrosporumorbiculare*).

Фармакокинетика:

Исследования фармакокинетики не проводились.

Показания к применению:

- х дерматозы, осложненные вторичной инфекцией;
- х эпидермофития стоп;
- х дерматомикозы (в т.ч. с локализацией в паховой области), вызванные чувствительными к препарату возбудителями.

Противопоказания:

- х повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- х туберкулез кожи;
- х кожные проявления сифилиса;
- х ветряная оспа;
- х простой герпес;
- х кожные реакции после вакцинации;
- х беременность и период лактации;
- х открытые раны;
- х детский возраст до 2 лет.

Способ применения и дозы:

Наружно. Крем наносят тонким слоем на пораженные участки кожи, утром и вечером. Продолжительность лечения зависит от эффективности и переносимости терапии и составляет 2-4 недели. *Детям (от 2 до 16 лет)* препарат назначают строго по назначению и под контролем врача, так как возможно развитие системных побочных эффектов, связанных с беклометазоном. При применении крема на обширных поверхностях, возможно подавление функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, снижение экскреции гормона роста, повышение внутричерепного давления.

Побочное действие:

Дерматологические реакции: жжение, гиперемия, эритема, шелушение, сухость, мацерация, атрофия кожи, стрии, гипертрихоз, фолликулит, потница, стероидные угри, периоральный дерматит, телеангиэктазия, гипопигментация, пиодермия, фурункулез.

Аллергические реакции: отек, крапивница, аллергический контактный дерматит.

Системные реакции (в т.ч. угнетение функции коры надпочечников) возможны при длительном применении.

Передозировка:

Симптомы: при превышении рекомендованных доз возможно развитие симптомов гиперкортинизма: увеличение массы тела, образование отеков, гипертезия, глюкозурия, гипокалиемия.

Лечение: симптоматическое, при необходимости проводят коррекцию электролитного баланса. Рекомендуется постепенная отмена препарата.

Лекарственные взаимодействия:

Нет данных.

Особые указания:

Препарат не применяют в офтальмологии. Не наносить на кожу в области глаз. С целью повышения эффективности терапии возможно использование окклюзивных повязок. Необходимо учитывать, что при этом усиливается трансдермальное всасывание беклометазона и гентамицина, которое ведет к увеличению риска развития системных побочных эффектов. При проявлении устойчивой бактериальной или грибковой микрофлоры следует прекратить применение препарата и назначить соответствующую терапию. Возможно развитие перекрестной резистентности с аминогликозидными антибиотиками.

Форма выпуска:

Крем для наружного применения 30 г в тубе, вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25°C и в местах, недоступных для детей.

Срок годности:

Указан на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

NEO UNIVERSE

Произведено для:

NEO UNIVERSE LLP

Лондон, Великобритания

Производитель:

Аурочем Лабораторис (И) Пвт. Лтд.

Индия

<https://neouniverse.tj>