

# Неолайк

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Неолайк.

**Международное непатентованное название:**  
Ацеклофенак + Метилсалицилат + Льянное масло +  
Ментол + Капсаицин.

**Лекарственная форма:** гель для наружного  
применения.

**Состав:** каждый грамм содержит:

Ацеклофенак ВР	1,5 % w/w;
Метилсалицилат ВР	10% w/w;
Цельное льянное масло ВР	3% w/w;
Ментол ВР	5% w/w;
Капсаицин USP	0,01% w/w;
Бензиловый спирт ВР (в качестве консерванта)	1% w/w;
Гелевая основа	q.s.

**Фармакотерапевтическая группа:** средства для  
наружного применения при мышечной и суставной  
боли.

**Код АТХ:** M02AX10.

**Фармакологические свойства:**

**Фармакодинамика:**

Комбинированный препарат для наружного  
применения, действие которого обусловлено  
взаимным усилением терапевтических свойств  
компонентов, входящих в его состав. Оказывает  
местное анальгезирующее, противовоспалительное и  
противоотечное действие.

**Ацеклофенак** представляет собой НПВП,  
обладающий противовоспалительным и  
анальгезирующим действием. Он подавляет развитие  
отека и эритемы независимо от этиологии воспаления.  
Ацеклофенак подавляет образование  
простагландинов и лейкотриенов за счет обратимого  
подавления ЦОГ-1 и ЦОГ-2.

Установленная клиническая эффективность  
ацеклофенака дополняется хорошей переносимостью.

**Метилсалицилат** вызывает местное раздражающее  
действие, покраснение кожи и способствует  
уменьшению чувства боли.

**Льянное масло** оказывает противовоспалительное,  
анальгетическое и обволакивающее действие.

**Ментол** при нанесении на кожу, вызывает  
раздражение нервных окончаний, что сопровождается  
развитием ощущения холода и анальгезирующим  
эффектом, а также приводит к сужению поверхностных  
кровеносных сосудов кожи и рефлекторного  
расширения сосудов внутренних органов.

**Капсаицин** является алкалоидом, который выделяют  
из перца стручкового. При местном применении  
вызывает сильное раздражение чувствительных  
рецепторов кожи. Повышает местный кровоток,  
способствуя уменьшению уровня воспалительных  
простагландинов.

**Фармакокинетика:**

При наружном применении ацеклофенак, метил-  
салицилат, льянное масло, ментол и капсаицин  
быстро абсорбируются и проникают в подкожную  
клетчатку, мышечную ткань, суставную капсулу и  
собственно в полость сустава.

**Показания к применению:**

Патологические состояния, характеризующиеся  
болевым синдромом и воспалением мышц, суставов,  
связок, сухожилий, в частности:

- ревматоидный артрит;
- анкилозирующий спондилоартрит;
- остеоартроз периферических суставов и позво-  
ночника;
- ревматическое поражение мягких тканей;
- воспаление связок, сухожилий, бурсит;
- посттравматическое воспаление мягких тканей и  
опорно-двигательного аппарата (повреждения и  
разрывы связок, ушибы, спортивные травмы);
- боли в нижней части спины, радикулит;
- диабетическая невропатия.

**Противопоказания:**

- повышенная чувствительность к ацеклофену или

другим НПВС, метилсалицилату, и к другим  
компонентам входящие в состав препарата;

- нарушение целостности кожного покрова;
- дерматиты;
- наличие инфекции, вызванной вирусом *Varicella zoster*;
- беременность и период кормления грудью;
- возраст до 16 лет (эффективность и безопасность  
применения у детей не исследовалась).

*С осторожностью* следует назначать при  
выраженных нарушениях функции печени и почек, при  
тяжелой хронической сердечной недостаточности,  
бронхиальной астме.

**Способ применения и дозы:**

Неолайк гель назначают только для наружного  
применения. Столбик геля длиной 2 см наносят (не  
втирая) на пораженный участок равномерным тонким  
слоем 3-4 раза в сутки. Одна доза составляет 2-3 г.  
Доза может варьироваться в зависимости от размеров  
пораженного участка и реакции на лечение.  
Продолжительность лечения не более 4 недель.

**Побочное действие:**

Местное раздражение, эритема, крапивница,  
десквамация в месте нанесения геля.

При возникновении любых побочных эффектов  
применение препарата следует прекратить.

**Передозировка:**

Случаи передозировки не выявлено.

**Взаимодействие с другими лекарственными  
средствами:**

Количество ацеклофенака, всасывающегося в кровь  
через кожу после местного применения геля невелико,  
кроме тех случаев, когда осуществляется лечение  
обширных участков в течение долгого периода, но о  
каких взаимодействиях данного препарата с другими  
лекарственными средствами не сообщалось. В любом  
случае, не следует использовать Неолайк гель в  
комбинации с другими лекарствами, содержащими  
ацеклофенак, и с осторожностью в сочетании с  
другими НПВС, т.к. увеличивается риск возникновения  
побочных эффектов. Перед началом применения  
Неолайк геля сообщите своему лечащему врачу или  
фармацевту о любых препаратах, которые вы  
принимаете в настоящий момент, включая  
гомеопатические и отпускаемые без рецепта  
препараты.

**Особые указания:**

Перед применением геля следует вымыть и высушить  
поверхность кожи.

Препарат следует наносить только на неповрежден-  
ную кожу, избегать попадания на открытые раны. Не  
следует применять под окклюзионную повязку. Не  
следует допускать попадания препарата в глаза и на  
слизистые оболочки.

Препарат не рекомендуется назначать детям,  
поскольку эффективность и безопасность применения  
у детей не исследовалась.

**Форма и упаковка:**

Гель для наружного применения 30 г в  
ламинированной тубе вместе с инструкцией по  
применению в картонной упаковке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при  
температуре не выше 25°C и в местах, недоступных  
для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении  
срока годности. Не замораживать.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

NEO UNIVERSE

Произведено для:  
**NEO UNIVERSE LLP**  
Лондон, Великобритания  
Производитель:  
Нанз Мед Сайнс Фарма (П) Лтд  
Индия  
<https://neouniverse.tj>