

# Проктофаст

## Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

**Торговое название:** Проктофаст.

**Международное непатентованное название:** комбинированный Препарат.

**Лекарственная форма:** Крем ректальный.

**Состав:**

Перец длинный	0,5 % w/w;
Хлорид натрия	0,5 % w/w;
Эмбелия кислая	0,5 % w/w;
Аргемона мексиканская	0,5 % w/w;
Сульфат железа	0,5 % w/w;
Калотропис высокий	2,5 % w/w;
Алоэ барбадосское	3,0 % w/w;
Центелла азиатская	1,5 % w/w;
Индийский крыжовник	1,5 % w/w;
Бибхитаки	1,5 % w/w;
Харитаки	1,5 % w/w;
Кунжут	21 % w/w;
Тальк	0,05 % w/w;
Цинка оксид	0,05 % w/w;
Бура	0,05 % w/w;
Глицерин	5,5 % w/w;
Камфора	1 % w/w;

Парфюмированная кремовая основа

q.s.

**Фармакотерапевтическая группа:** Препарат с противовоспалительным, ранозаживляющим и местноанестезирующим действием для местного применения в проктологии.

**Код АТХ:** C05AX03.

**Фармакологическое действие:**

*Фармакодинамика:*

*Перец длинный* оказывает антисептический эффект, увеличивает поглощение питательных веществ и улучшает усвоение других трав.

*Хлорид натрия* применяется для обработки гнойных ран (местно).

*Эмбелия кислая* антисептик, обладает вяжущими, ранозаживляющими и антибактериальными свойствами, оказывает охлаждающее воздействие, поднимает тонус организма, снимает жар.

*Аргемона мексиканская* применяется при ранах, обладает целебными свойствами.

*Сульфат железа* обладает вяжущим и кровоостанавливающим действием.

*Калотропис высокий* обладает антибактериальным и анестезирующим действием.

*Алоэ барбадосское* помогает при геморрое, обладает ранозаживляющим и антисептическим действием и служит для лечения мелких ранок прямой кишки, ведущих впоследствии к образованию геморроидальных узлов.

*Центелла азиатская* имеет эффективное противовоспалительное и кровоочистительное действие, применяется при лечении варикозного расширения вен, геморроя.

*Индийский крыжовник* природный антисептик, который подавляет жизнедеятельность патогенной микрофлоры половых путей и кишечника.

*Бибхитаки* оказывает одновременно как сильное послабляющее, так и сильное вяжущее действие, используют для лечения геморроя, обладает антисептическими, противовоспалительными, анальгетическими свойствами.

*Харитаки* останавливает кровотечение, обладает противовоспалительными, антисептическими, противогрибковыми, вяжущими свойствами.

*Кунжут* эффективен при лечении геморроя. Кроме этого, он содержит огромное количество меди. У меди, как известно, есть превосходные противовоспалительные свойства, которые также делают семена кунжута прекрасным лекарственным средством для лечения геморроя.

*Цинка оксид* обладает антисептическим, вяжущим, подсушивающим, адсорбирующим действием, уменьшает выраженность экссудативных процессов, устраняет местные проявления воспаления и раздражения, образует защитное покрытие на коже, которое уменьшает воздействие на нее раздражающих факторов.

*Бура* применяется в качестве антисептического средства.

*Глицерин* обладает хорошими увлажняющими, смягчающими и антисептическими свойствами.

*Борнео камфора* устраняет геморрагическую сыпь, расширяет сосуды, восстанавливает функцию пораженных органов и тканей.

*Фармакокинетика:*

Не изучена.

**Показания к применению:**

- наружный геморрой;
- трещины заднего прохода;
- анальный зуд.
- можно применять и с целью профилактики геморроя.

**Противопоказания:**

- повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата;
- не рекомендуется использование препарата при лечении детей в возрасте до 12 лет.

**Способ применения и дозы:**

Проктофаст следует применять после проведения гигиенических процедур области промежности.

Крем Проктофаст применять наружно.

При наружном применении крем наносят на кожу вокруг заднего прохода тонким слоем до 4 раз в день (на ночь, утром, а также после каждой дефекации, после предварительного обмывания области анального отверстия).

**Побочные действия:**

Побочные эффекты от использования препарата развиваются крайне редко при значительном превышении рекомендуемых доз. При длительном применении могут появиться следующие местные реакции: аллергические реакции, покраснение, зуд в области анального отверстия.

**Передозировка:**

В настоящее время о случаях передозировки не сообщалось.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами:**

Взаимодействия препарата с другими лекарственными средствами не наблюдалось.

**Особые указания:**

Облегчение признаков геморроя и стойкий терапевтический эффект развивается при регулярном использовании препарата.

Не следует превышать рекомендуемую ежедневную дозу без указания врача. В случаях кровотечений или отсутствия терапевтического эффекта после применения препарата в течение 7 дней следует срочно проконсультироваться с врачом.

**Форма выпуска:**

Крем ректальный 30 г в тубе. Одна туба вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.

**Условия хранения:**

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C, в местах недоступных для детей.

**Срок годности:**

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

**Условия отпуска:**

Без рецепта.

