

Энтеро Клинал

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Энтеро Клинал.

Международное непатентованное название: нет.

Лекарственная форма: раствор ректальный.

Состав:

Активные вещества: (каждая доставляемая доза 118 мл содержит)

Династрия гидрофосфат USP 7 г

Солевое слабительное

Натрия дигидрофосфат USP 19 г

Солевое слабительное

Фармакотерапевтическая группа: Слабительные. Слабительные препараты в клизмах. Натрия фосфат.

Код АТХ: A06AG01.

Фармакологические свойства:

Энтеро-клинал солевое слабительное, действие которого основано на увеличении с помощью осмотических процессов задержки воды в просвете кишечника. Накопление жидкости в кишке приводит к усилению перистальтики и последующему очищению кишечника. Время наступления эффекта 5–7 мин после введения.

Показания к применению:

✓ запоры;

✓ подготовка к эндоскопическому исследованию прямой кишки;

✓ подготовка к рентгенологическому исследованию органов брюшной полости;

✓ подготовка к хирургическим операциям на органах брюшной полости, родам.

Противопоказания:

✓ индивидуальная гиперчувствительность;

✓ непроходимость кишечника;

✓ перфорация кишечника;

✓ острый геморрой;

✓ трещины заднего прохода;

✓ острые воспалительные и/или язвенные поражения дистальных отделов ЖКТ;

✓ детский возраст.

Беременность и период лактации:

Клинические исследования у беременных женщин не проводились, поэтому применение препарата не рекомендуется и возможно по показаниям, когда потенциальная польза превышает риск применения.

Способ применения и дозы:

Взрослые, пожилые люди: не чаще одного раза в день или в соответствии с указаниями врача.

Препарат выпускается в одноразовых индивидуальных клизмах. Каждый флакон содержит 133 мл препарата, что обеспечивает объем доставляемой дозы 118 мл.

Способ введения:

Перед применением лечь на левый бок так, чтобы правая нога была согнута в коленном суставе (рис.1) или обе ноги согнуты в коленно-грудном положении (рис.2).

(рис.1)



(рис.2)



Снять защитный колпачок с бутылки (рис.3)

(рис.3)



Под постоянным давлением аккуратно введите смазанный наконечник клизмы в задний проход таким образом, чтобы он был направлен к пупку. Путем надавливания бутылочки-баллона ввести жидкость в кишечник. Сжимайте флакон, пока почти все его содержимое не перейдет в кишечник. Извлечь наконечник из прямой кишки. Пациент должен сохранять указанную позу до появления сильного

желания опорожнения кишечника.

Не обязательно выдавливать содержимое до конца, поскольку флакон содержит избыток препарата

В случае если при введении ощущается сопротивление, необходимо прекратить использование. Приложение чрезмерных усилий для введения клизмы может привести к нанесению повреждений.

Взрослым назначают по одному флакону или согласно указаниям врача.

Как правило желаемый эффект достигается через 5-7 минут. В случае, если по прошествии указанного времени не наступил ожидаемый эффект, необходимо прекратить дальнейшее лечение и проконсультироваться с врачом.

Клизмы, применяемые для лечения эпизодических запоров, приносят только кратковременное облегчение.

Побочные действия:

Возможны аллергические реакции, тошнота, рвота, боли в животе, местнораздражающее действие (раздражение вокруг анального отверстия).

Если любые из указанных выше побочных действий появляются и усугубляются или пациент заметил другие побочные действия, не указанные в описании, следует сообщить об этом врачу.

Передозировка:

Симптомы:

Передозировка при ректальном способе введения маловероятна. Может наблюдаться диарея, нарушение водно-электролитного баланса, обезвоживание.

Лечение:

Симптоматическое (назначение гидратационной терапии, противодиарейных средств). При первых признаках передозировки следует обратиться к врачу.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Не выявлено. Однако следует проконсультироваться с врачом, если пациент принимает антикоагулянты, препараты дигиталиса, ципрофлоксацин, этидронат, полистиренсульфонат натрия или антибиотики тетрациклинового ряда.

Особые указания:

В случае появления тошноты, рвоты, болей в брюшной полости следует проконсультироваться с врачом.

Форма выпуска:

Раствор ректальный 133 мл в пластиковом флаконе с пластиковым, предварительно смазанным наконечником (клизма) и защитным колпачком. Один флакон вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить при комнатной температуре. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

Указано на упаковке. Не использовать по истечении срока годности.

Условия отпуска:

Без рецепта.

NEO UNIVERSE

Произведено для:
NEO UNIVERSE LLP
Лондон, Великобритания

Производитель:
Алтова Хелскеа Лтд.
Индия