

ПРИСКЕТОЛ

Инструкция по медицинскому применению лекарственного средства

Торговое название: Прискетол.

Международное непатентованное название: мекбикар.

Лекарственная форма: таблетки.

Состав: одна таблетка содержит: мекбикар 500 мг

вспомогательные вещества: метилцеллюлоза, кальция стеарат.

Фармакотерапевтическая группа:

Психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), ноотропные средства. Другие психостимулирующие и ноотропные средства. Мекбикар.

Код АТХ: N06BX21.

Фармакологическое действие:

Фармакодинамика:

Действующее вещество лекарственного средства (мекбикар) по химической структуре близко к естественным метаболитам организма: молекула мекбикара состоит из двух метилированных фрагментов мочевины, входящих в состав бициклической структуры.

Мекбикар имеет умеренную транквилизирующую (анксиолитическую) активность, снимает или снижает чувство беспокойства, тревоги, страха, внутреннее эмоциональное напряжение и раздражение. Успокаивающий эффект лекарственного средства не сопровождается миорелаксацией и нарушением координации движений. Лекарственное средство не снижает умственную и двигательную активность, поэтому его можно применять в течение рабочего дня или во время обучения. Лекарственное средство не создает приподнятого настроения, ощущения эйфории. На этом основании мекбикар относят к дневным транквилизаторам. Лекарственное средство снотворного эффекта не оказывает, но усиливает действие снотворных средств и улучшает сон при его нарушении.

Кроме успокаивающего действия, лекарственное средство оказывает ноотропное действие. Мекбикар улучшает когнитивные функции, повышает внимание и умственную работоспособность, не стимулируя симптоматику продуктивных психопатологических расстройств, таких как бред, патологическая эмоциональная активность.

Лекарственное средство обладает антиоксидантной активностью, поэтому действует как мембраностабилизатор.

Прискетол действует на активность структур лимбико-ретикулярного комплекса, в частности на эмоциональные зоны гипоталамуса, а также влияет на все 4 основные нейромедиаторные системы - ГАМК-эргическую, холинергическую, серотонинергическую и адренергическую, что способствует их сбалансированности и интеграции, но не оказывает периферического адреноагонистического действия. В нейромедиаторном профиле действия лекарственного средства присутствует дофаминопозитивный компонент. Прискетол проявляет антагонистическую активность в отношении возбуждения адренергической и глутаматергической систем и усиливает функционирование тормозных серотонин- и ГАМК-эргических механизмов мозга. Лекарственное средство имеет нормостенические свойства. Мекбикар облегчает никотиновую абстиненцию.

Фармакокинетика:

При пероральном применении биодоступность составляет 77-80%; до 40% мекбикара связывается с эритроцитами; остальные 60% не связываются с белками крови и содержатся в плазме крови в свободном состоянии, в связи с чем мекбикар беспрепятственно распространяется в организме и свободно проникает через мембраны. Максимальная концентрация мекбикара в сыворотке крови достигается через 30 минут, высокий уровень сохраняется в течение 3-4 часов, затем постепенно снижается. Мекбикар полностью выводится из организма с мочой в течение суток, не накапливается и не подлежит биохимическим превращениям в организме.

Показания к применению:

Неврозы и неврозоподобные состояния, сопровождающиеся раздражением, эмоциональной лабильностью, чувством тревоги и страха; для улучшения переносимости нейролептиков или транквилизаторов с целью устранения вызванных ими соматовегетативных и неврологических побочных эффектов: кардиалгии различного генеза (не связанные с ишемической болезнью сердца); для облегчения течения соматовегетативных проявлений при предменструальном синдроме и менопаузе. Препарат показан как церебропротектор и адаптоген при эмоциональном и оксидантном стрессе различного генеза.

В составе комплексной терапии никотиновой зависимости как средство, уменьшающее тягу к

курению.

Противопоказания:

⚡ Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Беременность и период лактации: Мекбикар хорошо проникает во все ткани и жидкости организма.

Лекарственное средство не следует применять в период беременности или кормления грудью из-за отсутствия достаточных данных о безопасности применения мекбикара в этот период.

Способ применения и дозы:

Лекарственное средство принимают внутрь независимо от приема пищи. Дозировка зависит от индивидуальных особенностей пациента и терапевтической цели применения лекарственного средства. Обычная доза составляет 500 мг 2-3 раза в сутки. При необходимости дозу можно увеличить. Максимальная разовая доза - 3 г, максимальная суточная доза - 10 г. Продолжительность курса лечения - от нескольких дней до 2-3 месяцев.

В составе комплексного лечения никотиновой зависимости лекарственное средство применяют по 500-1000 мг 3 раза в сутки в течение 5-6 недель. Если один или несколько раз одновременно не была принята очередная доза, следует продолжить курс лечения в соответствии с ранее назначенной схемой. *Дети.*

Лекарственное средство не предназначено для применения у детей.

Побочные действия:

Обычно лекарственное средство переносится хорошо.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: редко - снижение артериального давления.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: редко - диспептические расстройства (в т.ч. тошнота, рвота, диарея). В таком случае следует снизить дозу лекарственного средства.

Со стороны дыхательной системы: редко - бронхоспазм.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: редко - аллергические реакции (в т.ч. кожная сыпь, зуд, крапивница, ангионевротический отек). В случае аллергической реакции прием лекарственного средства следует прекратить.

Общие нарушения: редко - снижение температуры тела, слабость, головокружение. При снижении артериального давления и/или температуры тела (температура тела может снизиться на 1-1,5 °C) прием лекарственного средства прекращать не нужно. Артериальное давление и температура тела нормализуются самостоятельно.

Передозировка:

Лекарственное средство малотоксичное. При значительной передозировке возможно усиление побочных эффектов (в т.ч. аллергические реакции, диспепсические расстройства, слабость, временное снижение артериального давления и температуры тела).

Лечение: необходимо промыть желудок и применить общепринятые методы дезинтоксикации.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами:

Мекбикар можно комбинировать с нейролептиками, транквилизаторами (бензодиазепинами), снотворными, антидепрессантами и психостимуляторами.

Особые указания:

Лекарственное средство следует применять с осторожностью при артериальной гипотензии, нарушениях функции печени и почек.

Привыкание, зависимость и синдром отмены при применении мекбикара не установлены.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами.

Следует соблюдать осторожность при управлении транспортными средствами, поскольку иногда применение мекбикара может приводить к снижению артериального давления.

Форма выпуска:

10 таблеток в каждом блистере, 2 блистера вместе с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Условия хранения:

Хранить в сухом, защищенном от света месте, при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности:

4 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска:

По рецепту.

NEO UNIVERSE

Произведено для:
NEO UNIVERSE LLP
Лондон, Великобритания

Производитель:
ОДО «ИНТЕРХИМ»
Одесса, Украина